

داروی گیاهی نیکوصفت

طرز استفاده از دارو برای بیماریهای میگرن، سینوزیت، آلرژی، سردرد، خروپف و سرماخوردگی



فاصله بین ریختن هر قطره و قطره بعد ۲ ثانیه
هر ۲ ساعت یکبار باید ۸ قطره دارو در بینی چکانده شود.
۴ قطره در حفره سمت راست و ۴ قطره هم در حفره سمت چپ.
فاصله بین ریختن هر قطره و قطره بعد ۲ ثانیه

دقت نمایید که برای چکاندن دارو نباید قطره چکان را بر کنید بلکه برای هر قطره به اندازه نیم سانتی متر دارو باید وارد قطره چکان شود. (مانند شکل مقابل)
بعد از چکاندن هر قطره دارو اطراف بینی و پیشانی را ماساژ دهید.

نکاتی که باید هنگام مصرف دارو رعایت شوند:

- بهتر است در حالت خوابیده به پشت قرار بگیرید و سر خود را به سمت بالا نگه دارید که دارو تا حد ممکن وارد حلق نشود. (به محض ریختن دارو با بالا کشیدن بلافاصله بینی از ورود دارو به حلق تا حدود زیادی جلوگیری می شود ولی اگر دارو وارد حلق شود هیچ مشکلی ندارد.)
در صورتی که امکان به پشت دراز کشیدن وجود نداشته باشد می توانید روی صندلی نشسته و سر خود را کاملاً به سمت عقب متمایل نمایید و قطرات را بریزید.
- قبل از استفاده شیشه دارو را تکان دهید.
- دارو را همیشه در یخچال نگهداری کنید.

محاسبه تعداد شیشه های مصرفی به این صورت است که به ازای هر سال ابتلاء به بیماری باید یک شیشه مصرف شود. هر چه مدت ابتلاء به بیماری طولانی تر باشد تعداد شیشه های مصرفی باید افزایش یابد مثلاً برای کسانی که ۲۰ سال مبتلا بوده اند تعداد شیشه ها ممکن است به ۲۰ عدد و بالاتر هم برسد.

با استفاده از مثلاً ۲ شیشه اول نا امید نشوید و تا بهبودی کامل به استفاده از شیشه های بعدی دارو ادامه دهید. ریختن دارو در بینی در طی شب ضروری نمی باشد استفاده از دارو اگر در طی ساعات روز به طور مرتب انجام شود. هر ۲ تا ۳ روز یک بار تقریباً باید یک شیشه تمام شود.

در مورد افرادی که دچار سینوزیت هستند گاهی در بعضی از موارد دیده شده که به علت تحریک چرک های موجود در پیشانی دچار سردردهای موقتی شده اند که این درد چند روز بیشتر طول نمی کشد و موجب نگرانی نیست با مسکن درد را تحمل نمایید تا دارو اثر کند.

افرادی که از میگرن و سردردهای شدید رنج می برند حتماً باید از لحظه رسیدن دارو به دستشان ریختن دارو در بینی را آغاز نمایند و به هیچ وجه منتظر وقوع حمله نشوند استفاده از این دارو در زمان حمله میگرنی و سردرد شدید هیچ اثری ندارد.

مصرف دارو ممکن است با کمی سوزش همراه باشد لطفاً تحمل نمایید در تعداد زیادی از افرادی که به سینوزیت مبتلا می باشند بعد از ریختن اولین شیشه ها حالت سرماخوردگی و ریزش شدید بینی مشاهده می شود که نشان دهنده رو به بهبودی رفتن و تخلیه سینوس ها می باشد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

در مورد کسانی که از درد شدید رنج می برند می توانند دارو را به جای هر دو ساعت یکبار (۸ قطره) هر یک ساعت یکبار (۸ قطره) استفاده نمایند.

بیمارانی که داروی گیاهی ما بر روی آنها اثر نمی کند، قطره زیبایی ما در حقیقت همان داروی گیاهی می باشد با تاثیر و قدرت بسیار بیشتر. اینگونه بیماران قبل از نا امید شدن میتوانند قطره زیبایی را هم به عنوان داروی قوی تر مورد آزمایش قرار دهند.

کسانی که با ریختن قطره در بینی مشکل دارند می توانند دارو را به صورت بخور استفاده کنند(طبق دستور مصرفی که در پشت صفحه برای بیماران آسمی ذکر شده. با این تفاوت که عمل بخور را هر ۲ ساعت یکبار - به غیر از شبها هنگام خواب- انجام دهند).

طرز استفاده از این دارو برای بیماریهای

قارچی پوست، دردهای عضلانی و مفصلی مانند زانو درد، کمر درد، روماتیسم و غیره

بر کردن ۲ قطره چکان با دارو (به اندازه شکل روبرو) و ریختن آن کف دست و سپس مالش دادن نقطه درد تا حدود پنج دقیقه.
و اگر چسبناک بودن دارو اذیت نمی کند اجازه دهید که دارو بر روی بدن بماند و در غیر اینصورت بعد از مالش دادن نقطه درد ، محل استعمال دارو را بشویید.
هر دو ساعت یکبار این عمل تکرار شود.

طرز استفاده از این دارو برای سرفه شدید

قرقره کردن و سپس خوردن دارو به اندازه یک قاشق چای خوری در هر بار استفاده (فاصله استعمال ۲ ساعت)

طرز استفاده از این دارو برای آسم

ابتدا طبق دستور مصرف بیماران سینوزیتی و... (که در بالای همین صفحه ذکر شده است) هر دو ساعت یکبار هشت قطره دارو در بینی بچکانید و اگر بعد از سه روز بهبودی حاصل نگردید طبق دستور زیر از عمل بخور دادن استفاده نمایید:
نصف شیشه دارو را با نیم لیوان آب مخلوط کرده و داخل ظرف بر روی حرارت مستقیم قرار دهید و شروع به بخور دادن نمایید و این عمل را به مدت ۱۰ دقیقه ادامه دهید.
کسانی که از آسم شدید رنج می برند این عمل را ۴ بار در روز (هر ۴ ساعت یکبار) انجام دهند. برای کسانی که از آسم خفیف رنج می برند یکبار بخور دادن در روز کافی می باشد.

